

كل ما تحتاج إلى معرفته عن

Paxlovid®

(نيرماتريليفير 150 ملغ | ريتونايفير 100 ملغ)

ابدأ العلاج الآن

يحقق باكسلوفيد أفضل النتائج عند البدء في تناوله خلال 5 أيام بعد ظهور الأعراض وفي أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف إصابتك بكوفيد-19.

لماذا وصف لي الطبيب باكسلوفيد؟

وصف لك الطبيب باكسلوفيد بسبب تشخيص إصابتك بكوفيد-19 بدرجة طفيفة إلى متوسطة، ولأنك عرضة لخطر تفاقم حالتك المرضية. قد ينتهي الحال بالأشخاص المصابين بكوفيد-19 بدرجة شديدة إلى دخول المستشفى للعلاج، بل وقد يتسبب المرض في وفاتهم. ويمكن أن يساعد باكسلوفيد في الحيلولة دون ذلك.

كيف أتناول باكسلوفيد؟

علاج باكسلوفيد مكون من دواءين مختلفين: أقراص وردية اللون تحتوي على دواء نيرماتريليفير، وأقراص بيضاء تحتوي على دواء ريتونايفير.


في المساء، تناول:

قرصين ورديين
قرص أبيض واحد



في الصباح، تناول:

قرصين ورديين
قرص أبيض واحد



ويجب عليك تناول الأقراص الثلاثة معًا في كل مرة حتى يحقق باكسلوفيد النتيجة المرجوة.

أحيانًا، لبعض الأشخاص، يوصي الطبيب بتعليمات مختلفة عن التعليمات السابقة. وفي تلك الحالة اتبع تعليمات طبيبك.

تناول باكسلوفيد لمدة 5 أيام، حتى لو بدأت تشعر بتحسن.



ابلع الأقراص كاملة، ولا تمضغها أو تكسرها أو تسحقها.



يمكنك تناول باكسلوفيد مع الطعام أو بدونه.



كيف أتصرف لو نسيت تناول باكسلوفيد؟

- تجاهل الأقراص التي نسيتها وتناول مجموعة الأقراص التالية في الوقت المفترض أن تقوم فيه بذلك.
- لا تتناول كمية مضاعفة من الأقراص في وقت واحد لتعويض الأقراص التي نسيتها.

الآثار الجانبية لبكسلوفيد

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب باكسلوفيد آثارًا جانبية. ومعظمها بسيط ومؤقت. ومع ذلك، قد تتطلب بعض الآثار الجانبية عناية طبية.

استشر طبيبك إذا حدثت لك أي من الآثار الجانبية التالية وشعرت بالقلق بسببها:



تغيرات في حاسة التذوق أو مذاق معدني في الفم.



وجع العضلات أو ضعفها



ارتفاع ضغط الدم



الصداع



الإسهال



التعب

اطلب الرعاية الطبية فورًا إذا عانيت من أي آثار غير معتادة تقلقك.



قبل البدء في تناول علاج باكسلوفيد

أخبر طبيبك إذا كنت:

تعاني من أي حالات طبية أخرى



تعاني من مشكلات في الكلى أو الكبد



تتناول أي أدوية أخرى، بما في ذلك أي فيتامينات أو مكملات غذائية تشتريها بدون وصفة طبية من الصيدلية أو السوبر ماركت أو متجر الأطعمة الصحية



كنتِ حاملاً، أو تخططين للحمل، أو تُرضعين رضاعة طبيعية، أو تخططين للإرضاع.



أثناء العلاج بباكسلوفيد

أمر يجب عليك القيام بها:

✓ أخبري طبيبك إذا صرت حاملاً أو إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية. ويجب عليكِ عدم الإرضاع أثناء تناول باكسلوفيد.

✓ احفظ باكسلوفيد في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية في مكان جاف بارد بعيداً عن الرطوبة أو الحرارة أو أشعة الشمس.

أمر يجب عليك عدم القيام بها:

✗ لا تتوقف عن تناول هذا الدواء أو تغيير عدد الأقراص التي تتناولها إلا بعد الرجوع إلى طبيبك.

✗ لا تعطِ دواءك إلى أي شخص آخر، ولو كان يعاني من الأعراض نفسها التي تعاني منها.

لا يمكنك تناول باكسلوفيد مع أدوية معينة لأن هذا قد يسبب آثاراً جانبية خطيرة أو يغير من طريقة عمل باكسلوفيد. يُرجى استشارة طبيبك إذا حدثت أي تغييرات في أي أدوية أخرى تتناولها حالياً.

لمعلومات أكثر عن باكسلوفيد



استشر طبيبك أو الصيدلاني إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف



تفضل بزيارة

www.paxlovededucation.com.au



اقرأ نشرة معلومات الدواء للمريض أو اطلب نسخة من طبيبك أو الصيدلاني

هذه المعلومات مخصصة للمرضى الذين وصف لهم الطبيب دواء باكسلوفيد. ولكنها ليست بديلاً عن المعلومات التي يقدمها لك طبيبك. استشر طبيبك إذا كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة حول تناول باكسلوفيد.

يُرجى طلب الرعاية الطبية فوراً إذا شعرت بأن حالتك تسوء أو لا تتحسن.

هذا الدواء يخضع لمراقبة إضافية. بما يسمح بالتعرف بسرعة على أي معلومات جديدة تتعلق بمدى أمانه. ويمكنك المساعدة في هذا بالإبلاغ عن أي آثار جانبية قد تتعرض لها. ويمكنك إبلاغ طبيبك بالآثار الجانبية، أو الإبلاغ عنها مباشرة على الموقع www.tga.gov.au/reporting-problems.