

Comprendere

Paxlovid®

(nirmatrelvir Compresse da 150 mg | ritonavir Compresse da 100 mg)

Perché mi è stato prescritto PAXLOVID?

Le è stato prescritto PAXLOVID perché Le è stato diagnosticato il COVID-19 da lieve a moderato e Lei è a rischio di contrarre una malattia seria. Le persone affette da COVID-19 grave talvolta finiscono in ospedale e possono persino morire. PAXLOVID può aiutare a fermare questo problema.

INIZIA IL TRATTAMENTO ORA

PAXLOVID funziona meglio se inizia ad assumerlo entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi e il prima possibile dopo aver scoperto di essere affetto/a da COVID-19.

Come si assume PAXLOVID?

PAXLOVID è costituito da due diversi medicinali: delle compresse rosa contenenti il medicinale nirmatrelvir e delle compresse bianche contenenti il medicinale ritonavir.

Al mattino, assumere:



2 compresse rosa
1 compressa bianca

La sera, assumere:



2 compresse rosa
1 compressa bianca

Affinché PAXLOVID funzioni, deve assumere tutte e 3 le compresse insieme ogni volta.

Per alcune persone, le istruzioni di cui sopra possono essere diverse. Segua le istruzioni forniteLe dal medico.



Può assumere PAXLOVID durante i pasti o a digiuno.



Ingerisca le compresse intere - non le mastichi, rompa o frantumi.



Assuma PAXLOVID per 5 giorni, anche se inizia a sentirsi meglio.

Se dimentico di assumere PAXLOVID?

- Salti queste compresse e assuma il lotto successivo di compresse nel momento in cui dovrebbe.
- NON raddoppi le compresse contemporaneamente per compensare le compresse che ha saltato.

Effetti collaterali di PAXLOVID

Come per tutti i medicinali, PAXLOVID può avere effetti collaterali. La maggior parte di essi sono minori e temporanei. Tuttavia, alcuni effetti collaterali potrebbero richiedere assistenza medica.

Parli con il medico se manifesta uno qualsiasi dei seguenti effetti collaterali e questi La preoccupano:



Vomito



Diarrea



Mal di testa



Pressione sanguigna elevata



Dolore o debolezza muscolare



Alterazioni del gusto o sapore metallico in bocca



Si rivolga immediatamente a un medico se manifesta eventuali effetti insoliti che La riguardano.

Prima del trattamento con PAXLOVID

Informi il medico se:



Presenta qualsiasi altra condizione medica



Ha problemi ai reni o al fegato



Sta assumendo qualsiasi medicinale, compresi eventuali vitamine o integratori acquistati senza prescrizione, in farmacia, al supermercato o in erboristeria



È incinta o sta pianificando di rimanere incinta; se sta allattando o sta pianificando di allattare con latte materno

Durante il trattamento con PAXLOVID

Cosa fare:

- ✓ Informi il medico se rimane incinta o sta allattando al seno. **Non deve allattare al seno mentre assume PAXLOVID.**
- ✓ Conservi PAXLOVID a temperatura inferiore a 25 °C in un luogo fresco e asciutto, lontano da umidità, calore o luce solare.

Cosa non fare:

- ✗ Non smetta di assumere questo medicinale o non cambi il numero di compresse che assume senza avere prima consultato il medico.
- ✗ Non dia il medicinale ad altri, anche se soffrono della Sua stessa patologia.

Non può assumere PAXLOVID insieme ad alcuni medicinali, in quanto ciò può causare effetti collaterali seri o cambiare l'azione di PAXLOVID.

Discuta con il Suo medico se ci sono eventuali cambiamenti in qualsiasi altro medicinale che sta attualmente assumendo.

Per ulteriori informazioni su PAXLOVID



Legga il [foglietto informativo sui medicinali per il consumatore](#) o ne richieda una copia al medico o al farmacista



Visiti www.paxlovideducation.com.au



Parli con il Suo medico o farmacista in caso di domande o dubbi

Queste informazioni sono destinate alle persone a cui è stato prescritto PAXLOVID. Non sostituiscono le informazioni del Suo medico. In caso di dubbi o domande sull'assunzione di PAXLOVID, si rivolga al Suo medico.

SI RIVOLGA IMMEDIATAMENTE A UN MEDICO SE RITIENE CHE LA SUA CONDIZIONE STIA PEGGIORANDO O NON MIGLIORI.

▼ Questo medicinale è sottoposto a monitoraggio aggiuntivo. Ciò consentirà una rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può aiutare segnalando eventuali effetti collaterali che potrebbe manifestare. Può segnalare gli effetti collaterali al Suo medico o direttamente su www.tga.gov.au/reporting-problems.



© 2022. Pfizer Inc. Tutti i diritti riservati. Il logo PFIZER è un marchio registrato di Pfizer Inc. www.pfizer.com.au. Informazioni mediche: 1800 675 229 www.pfizermedicalinformation.com.au. PP-PAX-AUS-0288. Ottobre 2022. PFIZ4536.