

了解

Paxlovid[®]

(奈玛特韦 150 mg 片剂 | 利托那韦 100 mg 片剂)

**立即
开始治疗**

如果您在出现症状后
5 天内开始服用 PAXLOVID，
以及在发现患有新冠肺炎后尽快
开始服用，PAXLOVID 的
治疗效果更佳。

为什么要给我开具 PAXLOVID 处方？

由于您被诊断为患有轻度至中度新冠肺炎，而且面临患严重疾病的风险，所以为您开具 PAXLOVID 处方。患有严重新冠肺炎的患者有时可能会住院，甚至死亡。PAXLOVID 可帮助阻止此类情况的发生。

如何服用 PAXLOVID？

PAXLOVID 由两种不同的药物组成：含有药物奈玛特韦的粉色药片和含有药物利托那韦的白色药片。

早上服用：



2 片粉色药片
1 片白色药片

晚上服用：



2 片粉色药片
1 片白色药片

您必须每次一起服用 3 片药片，这样 PAXLOVID 才能起作用。

对于部分人群，以上说明可能会有所不同。谨遵医嘱。



您可以随餐或
不随餐服用
PAXLOVID。



整片吞服药片，
不得咀嚼、掰碎
或压碎药片。



即便症状有所好转，
也请连续服用
PAXLOVID 5 天。

如果我忘记服用 PAXLOVID 怎么办？

- 略过漏服的剂量，并在应用药的时间服用下一剂药片。
- 请勿为了补足漏服的剂量而一次性服用双倍剂量的药片。

PAXLOVID 的副作用

与所有药物一样，PAXLOVID 可能有副作用。这些副作用大多数是轻微且暂时的。然而，一些副作用可能需要就医。

如果您出现下列任何副作用并受此困扰，请告知您的医生：



呕吐



腹泻



头痛



高血压



肌肉酸痛或无力



味觉改变或
口中有金属味。



如果您出现任何令您担忧的异常副作用，请立即就医。

使用 PAXLOVID 治疗前

如果您有以下情况，请告知您的医生：



有任何其他医疗状况



有肾脏或肝脏问题



正在服用任何药物，包括未经处方而从药房、超市或健康食品商店购买的任何维生素或补剂



已怀孕或计划怀孕、正在哺乳或计划哺乳。

使用 PAXLOVID 治疗期间

您应做的事：

- ✓ 如果您已怀孕或正在哺乳，请告知您的医生。
在服用 PAXLOVID 期间，您不得哺乳。
- ✓ 将 PAXLOVID 储存在 25°C 以下的阴凉干燥处，远离潮湿、高温和阳光。

您不应做的事：

- ✗ 在未咨询医生的情况下，请勿停用本药物或改变服用药片的数量。
- ✗ 请勿将您的药物提供给任何其他人，即使其患有与您相同的疾病。

您不得将 PAXLOVID 与某些药物一起服用，因为这可能引起严重的副作用，也可能改变 PAXLOVID 的作用效果。

如果您目前正在服用的任何其他药物有任何变化，请与您的医生讨论。

有关 PAXLOVID 的更多信息



阅读消费者用药信息说明书
或向您的医生或药剂师
索要一份副本



访问
www.paxlovideducation.com.au



如果您有任何问题或疑虑，
请咨询您的医生或药剂师

**此信息面向已被开具 PAXLOVID 处方的人士。此信息不能替代您的医生提供的信息。
如果您对服用 PAXLOVID 有任何疑问或问题，请咨询您的医生。**

如果您感觉病情恶化或没有改善，请立即就医。

▼本药物需要接受额外监测，以便快速识别新的安全性信息。您可报告您可能出现的任何副作用来提供帮助。您可将副作用报告给您的医生，也可直接访问 www.tga.gov.au/reporting-problems 进行报告。



© 2022. Pfizer Inc. 保留所有权利。PFIZER 徽标是 Pfizer Inc. 的注册商标。
www.pfizer.com.au. 医疗信息：1800 675 229 www.pfizermedicalinformation.com.au.
PP-PAX-AUS-0290. 2022 年 10 月. PFIZ4536.