

清楚認識

**Paxlovid**<sup>®</sup>  
(nirmatrelvir 150 mg tablets | ritonavir 100 mg tablets)

## 為何我獲處方 PAXLOVID?

之所以獲處方 PAXLOVID，是因為您確診感染輕微至中度的 COVID-19，而可能會患重症。當患上嚴重 COVID-19，有時或要入院，甚至可能死亡。PAXLOVID 有助防止這種情況發生。

## 立即開始 治療

如您在症狀出現後 5 天內以及在發現患上新型冠狀病毒 (COVID-19) 後盡快開始服用 PAXLOVID，可以獲得最佳藥效。

## 如何服用 PAXLOVID?

PAXLOVID 由兩種不同的藥物組成：粉紅色藥片含有藥物 nirmatrelvir，白色藥片含有藥物 ritonavir。

### 早上服用：



2 錠粉紅色藥片  
1 錠白色藥片

### 晚上服用：



2 錠粉紅色藥片  
1 錠白色藥片

## 您每次必須服用全部 3 錠藥片，PAXLOVID 才能發揮作用。

對某些人而言，以上指引或有不同。請遵循醫囑。



您可在飯前或飯後服用 PAXLOVID。



整錠吞服，請勿嚼碎、弄碎或壓碎。



即使您開始感到好轉，也請服用 PAXLOVID 5 天。

## 如果忘記服用 PAXLOVID，那怎麼辦？

- 跳過那些藥片，按建議服藥時間服用下一批藥。
- 切勿一次過服用雙重劑量的藥物，以彌補漏服劑量。

## PAXLOVID 的副作用

就如任何其他藥物一樣，PAXLOVID 可能產生副作用。大部分都是暫時出現的輕微副作用，但出現某些嚴重副作用時可能需要就醫。

如果出現以下任何副作用而令您感到擔憂，請諮詢您的醫生：



嘔吐



腹瀉



頭痛



高血壓



肌肉痠痛或無力



味覺有變或口中出現金屬味。



如果出現任何令您擔憂的異常現象，請立即就醫。

## PAXLOVID 治療前

如您出現以下情況，請告知醫生：



有任何其他醫療狀況



患有腎病或肝病



正在服用您購自藥房、超市或健康食品商店的任何其他非處方藥物，包括任何維他命或補充劑



正在或計劃懷孕或哺乳。

## PAXLOVID 治療期間

宜做事項：

- ✓ 如您正在懷孕或哺乳，請告知醫生。**服用 PAXLOVID 期間，不應哺乳。**
- ✓ PAXLOVID 應存放在 25°C 以下的陰涼乾爽位置，遠離濕氣、熱源或陽光。

禁做事項：

- ✗ 未經諮詢醫生，切勿停服本藥或更改服藥數量。
- ✗ 即使他人與您有相同病況，也切勿將您的藥物給予任何其他人。

**PAXLOVID 不能與某些其他藥物一起服用，以免產生嚴重副作用或改變 PAXLOVID 的作用。**

如您目前服用的任何其他藥物有變，請與醫生討論。

## 有關 PAXLOVID 的更多資訊



請閱讀《消費者用藥資訊單張》，  
或向醫生或藥劑師索取一份



請瀏覽  
[www.paxlovideducation.com.au](http://www.paxlovideducation.com.au)



如有任何問題或疑慮，  
請諮詢醫生或藥劑師

**本資料文件供獲處方 PAXLOVID 的人士參考，不宜取代醫囑。  
若對服用 PAXLOVID 有任何疑慮或問題，請諮詢醫生。**

**如果您覺得您的情況惡化或未有改善，請立即求醫。**

▼ 本藥需要額外監測，此有助迅速識別新的安全資訊。如您能夠報告身上可能出現的任何副作用，將有所幫助。您可向醫生或在 [www.tga.gov.au/reporting-problems](http://www.tga.gov.au/reporting-problems) 直接報告所出現的副作用。

